

Graines de Bleuet-Airelle

Semences non traitées de *Vaccinium angustifolium*

Caractéristiques principales

- Nom latin :** *Vaccinium angustifolium*,
Vaccinium brittonii, *Vaccinium lamarckii*, *Vaccinium nigrum*
- Nom vernaculaire :** Bleuet, Bleuet à feuilles étroites, Airelle, Airelle à feuilles étroites, Wild Lowbush Blueberry
- Variété :** type
- Lieu de culture :** Gazon & Prairies fleuries, Potager & Verger, *Jardin tempéré
- Hauteur :** 10 à 70 cm
- Type de plante :** Arbuste
- Feuilles :** Feuilles vert foncé très dentées et luisantes d'environ 3 cm de long virant au rouge en automne
- Flours :** Petites fleurs blanches en grappes pendantes d'environ 4 cm de long.
- Fruits :** Fruits sphériques comestibles bleu-noir d'environ 1.5 cm de diamètre.

Culture

- Exposition :** Mi-ombre
- Substrat / Sol :** Acide, Sableux, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)
- Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen
- Maladies / Ravageurs :** Pourriture des racines (causée par champignon, bactérie ou nématode), Pourriture du collet (maladie cryptogamique)
- Culture au jardin :** Cette plante de sous-bois est idéale en compagnie des azalées et des rhododendrons dans un substrat acide. Arrosez abondamment en période de sécheresse.
- Culture en pot :** Oui
- Conseils du comptoir des graines :** Facile à cultiver dans un contenant d'environ 40 cm de profondeur rempli de terre de bruyère.

Semis

- Facilité semis :** 2 Difficulté moyenne - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
- Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, entre 21°C et 24°C
Trempage : 24h, eau température ambiante (renouveler l'eau après 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à chaud : 1 mois, à 20°C
Stratification à froid : 1 à 3 mois
Substrat : mélange de 50 % de tourbe et 50 % de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : en automne
- Durée de germination :** 3 semaines à 3 mois, parfois plus de 1 an, lente et irrégulière
- Taux de germination :** 30 à 50 %

En savoir plus

- Origine :** Amérique du nord
- Intérêt :** *Fruits, Plante médicinale ou ayurvédique, *Productif, Plante d'ombre, *Comestible