



Semences non traitées de Cerinthe major



## Caractéristiques principales

<b>Nom latin :</b>	Cerinthe major
<b>Nom vernaculaire :</b>	Cerinthe, Grand Cérinthe, Cérinthe pourpre, Mélinet, Grand Mélinet, Mélinet pourpre, Cerflor, Palomera, Honeywort, Blue Shrimp Plant, Blue Wax Flower
<b>Variété :</b>	Purpureascens, Purperescens
<b>Origine :</b>	Zone méditerranéenne, Europe
<b>Lieu de culture :</b>	Jardin fleuri, *Jardin tempéré, *Serre chaude et Véranda, Gazon & Prairies fleuries, Culture en pot - Balcon & Terrasse
<b>Intérêt :</b>	*Fleurs, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Feuillage, Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de collection)
<b>Hauteur :</b>	45 cm
<b>Emprise au sol :</b>	40 cm
<b>Type de plante :</b>	Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1 <sup>ère</sup> année, fleurs la 2 <sup>ème</sup> année), Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an)
<b>Période de floraison :</b>	Été
<b>Feuilles :</b>	lisses, vert-bleu, tachetées de blanc.
<b>Fleurs :</b>	tubulaires, pendantes, parfumées, de couleur pourpre, aux bractées bleu-violet.
<b>Température minimale (Rusticité) :</b>	de -5°C à 0°C

## Culture

<b>Exposition :</b>	Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
<b>Substrat :</b>	Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), *Fertile, Bien drainant, Humide (garde très longtemps l'humidité)
<b>Arrosage :</b>	2 Arrosage moyen
<b>Maladies / Ravageurs :</b>	Pourriture du collet (maladie cryptogamique), Limaces, Escargots, Pucerons
<b>Culture au jardin :</b>	La Cerinthe se ressème naturellement et ne nécessite pas de soins particuliers.
<b>Culture en pot :</b>	Oui

## Semis

<b>Facilité semis :</b>	1 Facile
<b>Mode de semis :</b>	<b>Semis sous abri :</b> de mars à avril, entre 18°C et 22°C Trempe : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Profondeur : 1 à 3 mm, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Après germination : exposition à la lumière à 15°C Repiquage individuel : les plants manipulables, pots profonds Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé <b>Semis direct en place</b> (mieux) : d'avril à mai ou de septembre à octobre
<b>Durée de germination :</b>	1 à 4 semaines
<b>Taux de germination :</b>	environ 70 %

## En savoir plus