

## Graines de Cerinthe Purpurascens

[1CER0100]



Semences non traitées de Cerinthe major



## Caractéristiques principales

- Nom latin :** Cerinthe major  
**Nom vernaculaire :** Cerinthe, Grand Cérinthe, Cérinthe pourpre, Mélinet, Grand Mélinet, Mélinet pourpre, Cerflor, Palomera, Honeywort, Blue Shrimp Plant, Blue Wax Flower  
**Variété :** Purpureascens, Purperescens  
**Lieu de culture :** Jardin fleuri, \*Jardin tempéré, \*Serre chaude et Véranda, Gazon & Prairies fleuries, Culture en pot - Balcon & Terrasse  
**Hauteur :** 45 cm  
**Emprise au sol :** 40 cm  
**Type de plante :** Plante annuelle (cycle de vie sur 1 an), Plante bisannuelle (cycle de vie sur 2 ans, feuilles la 1ère année, fleurs la 2ème année)  
**Période de floraison :** Été  
**Feuilles :** lisses, vert-bleu, tachetées de blanc.  
**Flieurs :** tubulaires, pendantes, parfumées, de couleur poupre, aux bractées bleu-violet.  
**Température minimale (Rusticité) :** de -5°C à 0°C

## Culture

- Exposition :** Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre  
**Substrat / Sol :** \*Fertile, Bien drainant, Humide (garde très longtemps l'humidité), Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie)  
**Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen  
**Maladies / Ravageurs :** Limaces, Escargots, Pucerons, Pourriture du collet (maladie cryptogamique)  
**Culture au jardin :** La Cerinthe se ressème naturellement et ne nécessite pas de soins particuliers.  
**Culture en pot :** Oui

## Semis

- Facilité semis :** 1 Facile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu  
**Mode de semis :** **Semis sous abri :** de mars à avril, entre 18°C et 22°C  
 Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines  
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre  
 Profondeur : 1 à 3 mm, tasser légèrement le substrat  
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite  
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct  
 Après germination : exposition à la lumière à 15°C  
 Repiquage individuel : les plants manipulables, pots profonds  
 Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines  
 Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé  
**Semis direct en place (mieux) :** d'avril à mai ou de septembre à octobre  
**Durée de germination :** 1 à 4 semaines  
**Taux de germination :** environ 70 %

## En savoir plus

- Origine :** Europe, Zone méditerranéenne  
**Intérêt :** \*Flieurs, Plante amie des auxiliaires du jardin, \*Feuillage, Silhouette remarquable, Plante exceptionnelle (de collection)