



Semences non traitées de Rubus niveus



Caractéristiques principales

- Nom latin :** Rubus niveus
Nom vernaculaire : Framboisier de Mysore, Framboisier de Ceylan, Framboisier Hill
Variété : type
Lieu de culture : Potager & Verger, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Culture verticale - Tonnelle & Pergola, *A protéger en hiver, *Jardin tempéré, Haies & Bordures végétales
Hauteur : 1 à 4,5 m
Type de plante : Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante épineuse, Arbuste, Plante grimpante
Port : Rampant, Grimpant, Buissonnant, Tapissant
Période de floraison : Été
Feuilles : Feuilles pennées, 5 à 11 folioles, elliptiques, de 2,5 à 8 cm de long, de 1 à 4 cm de large, face supérieure glabre, vert foncé, face inférieure duveteuse, blanc-gris, pétioles et rachis avec aiguillons.
Fleurs : Floraison de juin à juillet. Fleurs en panicules courtes, terminales, 5 à 7 pétales rose pourpre à rouge, de 4 à 5 mm de long.
Fruits : Fruit rouge foncé devenant noir violet, duveteux, de 0,8 à 1,5 cm de long.
Autres : Tiges d'abord blanchâtres et duveteuses, puis vert glabre à rouge foncé violet plus tard, robustes, avec aiguillons crochus de 3 à 7 mm de long.
Température minimale (Rusticité) : de 0°C à 5°C
Recommandations : Plante envahissante à Hawaii et aux îles Galápagos. Très sensible à la sécheresse.

Culture

- Exposition :** Ombre, Mi-ombre, Ensoleillé
Substrat / Sol : Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant
Arrosage (plante adulte) : 4/5 Arrosage abondant
Maladies / Ravageurs : Rouille (maladie cryptogamique), Thrips, Anthracnose (taches brunes à noires du feuillage - maladies cryptogamiques), Acariens, Maladies cryptogamiques, Taches foliaires
Culture en pot : Non
Conseils du comptoir des graines : Les fruits se consomment crus ou cuits, en desserts et confitures. Fruits tendres, juteux, saveur légèrement sucrée.

Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis : **Semis sous abri :** dès réception des graines
Stratification à froid : au moins 1 mois
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants manipulables
Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place (mieux) : en automne
Sensible à la fonte des semis
Durée de germination : semis sous abri : 3 semaines à plusieurs mois, lente et irrégulière
si pas de germination : 2ème stratification à froid
semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps
Taux de germination : environ 80 %

En savoir plus

- Origine :** *Asie orientale, Inde, Chine
Intérêt : *Fruits, Plante d'ombre, Plante tinctoriale - Colorant & Teinture végétale, *Permaculture, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Comestible
Récolte : Récoltez les fruits bien noirs qui se détachent facilement et consommez-les rapidement.
Conservation : Les fruits se conservent 24h dans le bac à légumes du réfrigérateur. Se congèlent très bien.