

Graines de Sorbier domestique - Cormier

[5SOR0101]



Semences non traitées de Sorbus domestica



Caractéristiques principales

- Nom latin :** Sorbus domestica
Nom vernaculaire : Sorbier domestique, Cormier
Variété : type
Lieu de culture : *Jardin tempéré, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Gazon & Prairies fleuries, *Jardin tropical, Potager & Verger
Hauteur : 20 m
Emprise au sol : 12 m
Type de plante : Arbre
Port : Colonne (élançé), Arrondi
Type de feuillage : Caduque
Période de floraison : Printemps
Feuilles : Feuilles vert foncé virant à l'or en automne, de 10 à 20 cm de long, pennées, jusqu'à 21 folioles étroites, oblongues, alternes.
Flours : Floraison au printemps. Fleurs blanches de 5 à 8 cm de large, réunies en corymbes coniques.
Fruits : Baies vert-jaune nuancé de rouge, de 1 à 3 cm de diamètre, sphériques ou en poire.
Température minimale (Rusticité) : *inférieure à -5°C
Recommandations : **Attention :** l'ingestion des fruits crus peut provoquer de légères nausées.

Culture

- Exposition :** Plein soleil, Ensoleillé, Mi-ombre
Substrat / Sol : Bien drainant, *Humifère, Riche, fertile & humifère
Arrosage (plante adulte) : 2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs : Pucerons, Cochenilles farineuses, Maladies cryptogamiques, Araignées rouges, *Armillaire (pourridié - champignon), Chancre (lésion nécrosée du tissu ligneux externe)
Culture en pot : Oui
Conseils du comptoir des graines : Les fruits blets s'utilisent dans la fabrication de liqueurs et de confitures. Magnifique en bonsaï.

Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis : **Semis sous abri :** au début du printemps, à partir de 20°C
 Stratification à chaud : 2 semaines, entre 15°C et 25°C
 Stratification à froid : 2 à 4 mois
 Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
 Besoin de lumière pour germer : oui
 Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
 Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
 Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
 Repiquage individuel : les plants manipulables
 Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers
 Rempotage : quand le système racinaire est bien développé
 Plantation en place : en automne
Semis pleine terre en pépinière : en automne
Durée de germination : semis sous abri : 4 à 6 mois, lente et irrégulière
 si pas de germination : 2ème stratification à froid
 semis pleine terre en pépinière : au 1er ou 2ème printemps

En savoir plus

- Origine :** Europe, *Asie occidentale, Zone méditerranéenne, Afrique du nord
Intérêt : *Fruits, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Comestible, *Plante mellifère, *Bonsaï d'extérieur, *Bois, *Feuillage d'automne, *Permaculture