

Graines de Gunnère du Brésil

[1GUN0101]

Semences non traitées de *Gunnera manicata*

Caractéristiques principales

- Nom latin :** *Gunnera manicata*,
Gunnera brasiliensis
- Nom vernaculaire :** Gunnère du Brésil, Rhubarbe géante du Brésil, Giant Rhubarb, Brazilian Rhubarb, Mammoth Sheet, Dinosaur Food
- Variété :** type
- Lieu de culture :** Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement, Jardin d'eau & Bassin
- Hauteur :** 2 à 3 m, croissance lente au début, puis rapide
- Emprise au sol :** 2 à 4 m
- Type de plante :** Plante traçante, Plante fleurie, Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante épineuse, Hermaphrodite (organes mâles et femelles dans chaque fleur), Plante verte, Plante à rhizome (tige souterraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive)
- Port :** Dressé (érigé), Etalé
- Type de feuillage :** Caduque
- Période de floraison :** Automne, Printemps, Été
- Feuilles :** Grandes et larges feuilles vertes, de 2 à 3 m de diamètre, palmatilobées, dentelées, gaufrées, nervures très marquées d'une teinte vert doré au soleil, épines molles, pétioles géants, épines molles.
- Fleurs :** Floraison de mai et à l'automne. Gros épis, 60 à 100 cm, d'épillets de plus de 15 cm de long, flexibles, de minuscules fleurs rouge-verdâtre qui brunissent à l'automne.
- Fruits :** Fructification d'août à novembre. Baies sphériques rouge-vert. Minuscules graines rondes.
- Autres :** Grosse souche rhizomateuse avec un gros bourgeon fibreux rouge et des racines adventives traçantes.
- Température minimale (Rusticité) :** de -5°C à 0°C
- Recommandations :** **Attention :** le *Gunnera manicata* s'étend rapidement grâce à ses rhizomes traçants. Elle peut devenir envahissante au fil des années si les conditions lui sont particulièrement favorables. Elle est enregistrée comme plante envahissante au Royaume-Uni, Irlande et Nouvelle-Zélande.

Culture

- Exposition :** Mi-ombre, A l'abri du vent, A protéger en hiver, Ombre, Ensoleillé, Craint la chaleur
- Substrat / Sol :** Humide (garde très longtemps l'humidité), Craint le calcaire, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond, Argileux, Riche, fertile & humifère
- Arrosage (plante adulte) :** 4/5 Arrosage abondant, Craint l'excès d'humidité en hiver, Craint la sécheresse
- Maladies / Ravageurs :** Limaces, Escargots
- Culture au jardin :** Paillez le pied avant l'hiver pour le protéger du froid avec une épaisse couche de ses propres feuilles (environ 50 cm), couverte d'une bâche imperméable et des grands pétioles pour éviter que le paillage s'envole avec le vent. La plante paillée ainsi tolère -20°C à partir de ses 3 ans si le sol ne reste pas humide en hiver.
- Culture en pot :** Oui
- Conseils du comptoir des graines :** Le *Gunnera manicata* est capable de capter l'azote de l'air grâce à une symbiose avec des cyanobactéries, ce qui explique sa croissance hors normes.

Semis

- Facilité semis :** 3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
- Mode de semis :** **Mettre des gants pour toucher les graines** (la graisse de la peau peut inhiber la germination)
- Semis sous abri :** au début du printemps, entre 24°C et 28°C, chaleur de fond si possible
- Trempage :** 12h à 24h, eau température ambiante, jusqu'au gonflement des graines
- Contenant :** pots individuels
- Substrat :** mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
- Besoin de lumière pour germer :** oui
- Profondeur :** semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
- Couvert en surface :** 3 mm de vermiculite
- Luminosité :** pleine lumière, sans soleil direct
- Hivernage sous abri :** pendant 2 hivers
- Rempotage :** quand le système racinaire est bien développé, au moins 1 an après la levée
- Acclimatation à l'extérieur :** pendant 1 à 2 semaines
- Plantation en place :** après les dernières gelées, sans enterrer le bourgeon
- Durée de germination :** 10 jours à 3 mois, parfois plus, lente et irrégulière
- Si pas de germination après 4 mois :** 1 à 2 mois de stratification à froid
- Taux de germination :** très variable, entre 30 % et 80%

En savoir plus

Origine : Amérique du Sud

Intérêt : Silhouette remarquable, Plante aquatique ou bord d'eau, Plante d'ombre