



Semences non traitées de Metasequoia glyptostroboides 80%



Caractéristiques principales

- Nom latin :** Metasequoia glyptostroboides 80%
- Nom vernaculaire :** Séquoia de Chine 80%, Métaséquoia du Sechuan, Sapin d'eau, Dawn Redwood
- Variété :** graines triées à 80% de taux de germination
- Lieu de culture :** Jardin Couleurs d'automne, Culture en pot - Balcon & Terrasse
- Hauteur :** 20 à 40 m
- Type de plante :** Arbre
- Type de feuillage :** Caduque, Persistante
- Feuilles :** Feuilles en aiguilles vert intense relativement souples qui jaunissent en automne jusqu'à prendre une belle couleur brun-doré.
- Fleurs :** Cônes femelles ovoïdes, brun clair, cônes mâles sphériques, brun foncé et écailleux.

Culture

- Exposition :** Pleine lumière
- Substrat / Sol :** Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Terre de jardin, Riche, fertile & humifère, Acide
- Arrosage (plante adulte) :** 2/5 Arrosage moyen
- Culture au jardin :** Cultivez en climat plutôt humide.
Magnifique en bonsaï.
- Culture en pot :** Oui

Semis

- Facilité semis :** 2 Difficulté moyenne - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
- Mode de semis :** **Semis sous abri :** au printemps, à 22°C
Trempage : 24h à 48h, eau chaude (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines
Stratification à froid : 1 à 3 mois
Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre
Besoin de lumière pour germer : oui
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir les graines de substrat, tasser légèrement le substrat
Couvert en surface : 3 mm de vermiculite
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles
Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers
Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Semis direct en place : en automne
- Durée de germination :** semis sous abri : 1 semaine à 3 mois, lente et irrégulière
si pas de germination après 4 mois : 2ème stratification à froid
semis direct en place : au 1er ou 2ème printemps
- Taux de germination :** 80 %

En savoir plus

- Origine :** Chine
- Intérêt :** Silhouette remarquable, Bonsaï