


Graines de Érable à sucre

[1ACE0105]



Semences non traitées de Acer saccharum



Caractéristiques principales

Nom latin :	Acer saccharum
Nom vernaculaire :	Érable à sucre, Érable franc, Sugar maple
Variété :	type
Lieu de culture :	Jardin Couleurs d'automne, Culture en pot - Balcon & Terrasse, Jardin d'ornement
Hauteur :	20 à 25 m
Emprise au sol :	10 à 12 m
Type de plante :	Arbre
Port :	Arrondi, Colonne (élancé)
Type de feuillage :	Caduque
Période de floraison :	Printemps
Feuilles :	Ovales, trilobées, de 20 cm de long, passant du vert pâle en été à l'orange vif, au rouge et au jaune en automne.
Fleurs :	Floraison de mars à avril. Petits corymbes de fleurs insignifiantes, jaune verdâtre.
Température minimale (Rusticité) :	inférieure à -20°C

Culture

Exposition :	Ensoleillé, Mi-ombre
Substrat / Sol :	Argileux, Riche, fertile & humifère, Acide, Craint le calcaire, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Profond
Arrosage (plante adulte) :	Craint l'excès d'humidité, 2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Chenilles, Cochenilles, Acariens
Culture au jardin :	Magnifique en bonsaï.
Culture en pot :	En bonsaï

Semis

Facilité semis :	3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Semis sous abri : au début du printemps, entre 18°C et 21°C Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines Stratification à froid : 1 à 3 mois Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Profondeur : 3 à 5 mm, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants manipulables Hivernage sous abri : pendant 1 ou 2 hivers Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines Plantation en place : après les dernières gelées, quand le système racinaire est bien développé
Durée de germination :	1 à 4 mois, voir plus d'un an, lente et irrégulière Si pas de germination : 2ème stratification à froid Taux de germination : environ 30 à 40 %

En savoir plus

Origine :	Amérique du nord
Intérêt :	Plante exceptionnelle (de collection), Bonsaï, Ecorce remarquable