

Graines de Acer palmatum Atropurpureum

[1ACE0107]



Erable Pourpre du Japon Semences non traitées



Caractéristiques principales

Nom vernaculaire :	Erable de Japon Rouge, Erable de Japon à Feuilles Rouges, Erable de Japon Pourpre, Redleaf Japanese Maple
Variété :	Atropurpureum (Rouge ou Pourpre)
Lieu de culture :	Culture en pot - Balcon & Terrasse, *Jardin tempéré
Hauteur :	8 m
Emprise au sol :	10 m
Type de plante :	Arbre
Port :	Arrondi
Type de feuillage :	Caducue
Feuilles :	Rondes, lobées, rouge-pourpre, passant au rouge vif à l'automne
Fleurs :	Très petites, rouge pourpre, en corymbes pendants
Fruits :	Rouges, ailés
Autres :	Écorce rouge
Recommandations :	Sensible au Verticillium, éviter la proximité des champs de pommes de terre car vecteurs de cette maladie.

Culture

Exposition :	Mi-ombre, Pleine lumière
Substrat / Sol :	Humide (garde très longtemps l'humidité), Bien drainant, Acide, Profond, *Humifère
Arrosage (plante adulte) :	2/5 Arrosage moyen
Maladies / Ravageurs :	Alternariose (brûlure du feuillage - maladie cryptogamique), Chenilles, *Armillaire (pourridié - champignon), Cochenilles, Acariens
Culture au jardin :	L'arrosage de cet arbre doit-être régulier en été mais il faut éviter de détremper le sol en hiver, les gelures des racines étant généralement fatales. Magnifique en bonsaï.
Culture en pot :	Oui
Conseils du comptoir des graines :	Dans les régions du sud, protégez du soleil direct en été.

Semis

Facilité semis :	3 Difficile - voir aussi les conseils de semis généraux dans le menu
Mode de semis :	Trempage : 24h à 48h, eau tiède (renouveler l'eau toutes les 12h), jusqu'au gonflement des graines Stratification à froid : 2 à 5 mois Semis sous abri : au début du printemps Température de semis : entre 18°C et 20°C (pas plus de 25°C) Substrat : mélange de terreau spécial semis et de sable, humide mais non trempé, irrigation par le bas, couvercle transparent jusqu'à la levée, aérer régulièrement cette mini-serre Profondeur : le diamètre de la graine, tasser légèrement le substrat Couvert en surface : 3 mm de vermiculite Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct Repiquage individuel : les plants de plus de 4 feuilles Hivernage sous abri : pendant 2 ou 3 hivers Rempotage : quand le système racinaire est bien développé Acclimatation à l'extérieur : pendant 1 à 2 semaines Plantation en place : après les dernières gelées Germination : 1 à 2 mois, lente et irrégulière Si pas de germination : 2ème stratification à froid Taux de germination : environ 30 à 60 %

En savoir plus

Origine :	*Asie orientale
Intérêt :	*Feuillage, *Feuillage d'automne, *Bonsaï d'extérieur, Ecorce remarquable